



RECUERDE QUE PUEDE LLAMAR LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

INFECCIÓN DEL OÍDO MEDIO

Las infecciones del oído medio ocurren en la profundidad del oído. Éstas son comunes en niños pequeños y frecuentemente se presentan después de una gripe. Los tubos de adentro del oído se tapan y la bacteria empieza a crecer.

SÍNTOMAS

- A su hijo le duele el oído. Los bebés tal vez se soben o se jalen la oreja.
- Su hijo tiene fiebre y no se ve o se siente bien.
- Puede ser que su hijo tenga dificultad para oír.

¿QUÉ HACER?

Llame al doctor. Los antibióticos pueden ayudarle. Trate el dolor con ibuprofen o Tylenol®.

INFECCIÓN DEL OÍDO EXTERIOR (“OÍDO DE NADADOR”)

Las infecciones del oído exterior ocurren en los canales cerca del exterior del oído. Éstas suceden cuando el agua o la mugre se quedan atrapadas, y la bacteria empieza a crecer.

SÍNTOMAS

- A su hijo le duele el oído aún más cuando mastica o se jala la oreja.
- Su hijo puede decir que siente el oído tapado.
- Puede ser que la parte interior del oído se vea roja o hinchada.

¿QUÉ PUEDO HACER?

Llame a su doctor. Algunos doctores le sugerirán que use medicinas que no requieren receta médica y que sirven para curar “el oído de nadador.” Otros doctores van a recetarle unas gotas para el oído. El dolor puede ser tratado con ibuprofen o Tylenol®. Evite la entrada de agua en el oído hasta que la infección esté curada.



**Siempre La
Llamada Correcta.**
Su Hogar Médico.